


気温 ()

広島市の2月の気象 (平成14年)



大気現象	
不照	3日
雪	7日
霧	1日
雷	0日
天気記号	
☉	快晴
☀	晴れ
☁	曇り
☁	薄曇り
☁	雨
*	雪
☂	みぞれ
☂	のち
/	一時
//	時々

日付	最高気温 (平年)	最低気温 (平年)	降水量 (ミリ)	雑象		
2/1	10.5	9.2	0.9	1.1	0.0	
2	10.1	9.3	1.9	1.1		2日 日本無降水記録92日終 (大6.11.3~7.2.2大分)
3	12.7	9.3	3.1	1.2	0.0	
4	12.2	9.4	0.7	1.2		
5	12.0	9.5	3.5	1.2		6日 うめ開花
6	14.1	9.6	2.6	1.3		
7	15.7	9.7	2.6	1.4		
8	12.5	9.9	-0.1	1.4	0.0	
9	11.2	10.0	3.9	1.5	0.0	
10	8.3	10.1	1.8	1.6	1.0	
11	6.5	10.2	0.5	1.7	5.5	14日 日本山岳最深積雪1182cm (昭2 伊吹山)
12	9.4	10.3	-1.3	1.8	0.0	
13	9.8	10.4	-0.2	1.9	0.0	
14	10.8	10.4	1.4	2.0	0.0	
15	10.8	10.5	-0.5	2.0		16日 日本天気図作成開始 (明16)
16	11.9	10.5	0.0	2.1		
17	8.0	10.5	4.1	2.2	1.0	
18	11.2	10.5	2.3	2.2	0.0	* 広島ではこの頃から本格的に スギ花粉の飛散がはじまる。
19	6.5	10.5	0.6	2.2	0.0	
20	11.9	10.5	0.2	2.3		
21	14.1	10.5	1.4	2.3	0.5	25日 春一番平年日
22	16.9	10.6	8.3	2.3	3.0	(中国地方)
23	14.5	10.6	3.9	2.3		
24	14.5	10.7	5.3	2.3		27日 富士山最低気温 - 38.0 (昭56)
25	13.1	10.8	1.6	2.4		
26	11.0	10.9	5.7	2.4	0.0	27日 たんぽぽ開花
27	13.5	11.1	8.4	2.5	5.0	
28	13.4	11.2	9.4	2.5	8.5	

日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
天気	☉	☉	☉	/	☉	☉	☉	☉	☉	/	☉	☉	☉	☉	/	☉	☉	*	/	☉	☉	☉	☉	☉	/	☉		

最高・最低気温及び気象現象の平年値は、広島地方気象台《1971年～2000年(江波山1971年～1987年、上八丁堀1988年～2000年)》の観測値である。
 天気及び降水量は一日(0時～24時)のデータを表示している。(広島地方気象台提供資料参照)

2月の気象メモ

日本気象協会中国支店は6日、例年(2月22日)より半月早くスギ花粉の飛散開始を発表しました。今年は、1月に暖かい日が多かったため、飛散時期が早まったようです。スギ花粉の飛散量は前年夏の気象が影響します。これは、スギの芽がつくられる夏の気温が高く雨が少なく多くの花芽ができるためです。今年は昨年夏の猛暑の影響で飛散量が多い見込みです。

気象現象	冬日	日照時間	月降水量	最高気温 月平均	最低気温 月平均
今月	4日	159.4時間	24.5ミリ	11.7	2.6
71～'00 平年	8.8日	131.1時間	66.9ミリ	10.2	1.8

冬日とは、最低気温が0 未満の日をいう。 降水量の - は雨が降らなかった日、0.0は雨が降ったが0.5ミリ未満であった日を示す。